



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

ارزیابی ریسک بی قراری - آرامش
بیمار - ریچموند
agitation sedation scale (RASS)

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
شماره سند :
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵ / ۰۲ / ۰۱
تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۵ / ۰۲ / ۱۵
تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۶ / ۰۲ / ۰۱
ویرایش : ۵

ارزیابی ریسک بی قراری - آرامش - ریچموند

ریسک فاکتور	معیار	امتیاز
بیمار بیش از حد عصبی و خشن است و می تواند برای پرستار خطرناک باشد	خشن و تحریک پذیر	۴+
لوله ها و کاتترها را می کشد و در می آورد و رفتار خشونت آمیزی دارد	بسیار آژितه	۳+
حرکات بی هدف و تکراری دارد . تهویه بیمار روی سیستم سینکرونایز قرار ندارد	آژیته	۲+
اما حرکات تهاجمی یا خشونت آمیز از خود نشان نمی دهد	بی قرار مضطرب و بی قرار	۱+
بیمار کاملاً آرام و راحت است	بیدار و آرام	۰
اما بیش از ۱۰ ثانیه بیدار می ماند و می تواند با درخواست کلامی چشمان خود را باز کند	خواب آلود کاملاً هوشیار نیست	۱-
(کمتر از ۱۰ ثانیه) بیدار می ماند و با درخواست کلامی چشمان خود را باز می کند	سداسیون سبک مدت کوتاهی	۲-
با درخواست کلامی حرکات محدود دارد (اما تماس چشمی ندارد)	سداسیون متوسط	۳-
هیچ واکنشی به صدا ندارد اما با تحریک فیزیکی حرکت می کند .	سداسیون عمیق	۴-
هیچ واکنشی به تحریک صوتی یا فیزیکی نشان نمی دهد .	غیرقابل هوشیار بودن (کما)	۵-