



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

ارزیابی ریسک سقوط بیمار در کودکان Fall Risk In Pediatric

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

شماره سند : ویرایش : ۵

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۶/۰۲/۰۱

ارزیابی ریسک سقوط بیمار در کودکان – هامپی دامپی – Humpty Dumpty

امتیاز	معیار	ریسک فاکتور
۴	سن > ۳ سال	سن
۳	سن ۷ - ۳ سال	
۲	سن ۱۳ - ۷ سال	
۱	سن ۱۳ سال یا < ۱۳ سال	
۲	پسر	جنس
۱	دختر	
۳	تشخیص های نورولوژیک (مانند صرع، ضربه به سر، هیدروسفالی، فلج مغزی و ...)	تشخیص بالینی
۳	اختلال در اکسیژن رسانی (مانند تشخیص تنفسی، دهیدروتاسیون، آنمی، بی اشتها، سنکوپ و)	
۲	اختلال روانی- رفتاری (اختلالات خلقی مانند افسردگی شدید، اختلال دو قطبی و)	
۲	تشخیص های دیگر که شامل موارد بالا نباشد.	
۲	بیمار به نا توانی های جسمی خود آگاهی ندارد. (مثلا بیمار شیرخوار است یا دچار آسیب مغزی شده است)	اختلالات شناختی
	بیمار به ناتوانی های جسمی خود آگاهی دارد ولی به دلیل مشکل فعلی که برایش ایجاد شده است. (مثلا" هایپوگلاسمی و یا ضعف) محدودیت ها و ناتوانی های خود را فراموش کرده است. یا کودک تحت درمان با آرام بخش یا تحت تاثیر بیهوشی است. یا کودک لجباز است.	
۱	بیمار به ناتوانی های جسمی خود آگاهی کامل دارد.	
۴	سابقه سقوط در بستری فعلی یا بستری قبلی دارد. یا بیمار کودک نو پا یا شیرخوار است که در تخت مناسب کودک قرار نگرفته است.	
۳	بیمار از وسایل کمک حرکتی مانند ویلچر ، عصا یا واکر استفاده می کند. یا بیمار کودک یا شیرخواری است که در تخت مخصوص کودک قرار گرفته ، اما در اتاق چند تخته ، با نور کم و وسایل و تجهیزات پزشکی متعدد است.	فاکتورهای محیطی
۲	بیمار بزرگ تر از ۳ سال که در تخت است.	
۱	بیماری که جهت انجام تست های تشخیصی به صورت سرپایی مراجعه کرده است.	
۳	تا ۲۴ ساعت بعد از عمل جراحی	
۲	تا ۴۸ ساعت بعد از عمل جراحی	پاسخ به جراحی، مسکن و یا داروهای بیهوشی
۱	بیش از ۴۸ ساعت گذشته است یا اصلا انجام نشده است.	
۳	استفاده همزمان از داروهای زیر	داروهای مصرفی
	مسکن ها (به غیر از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه که کاملا بیهوش و فلج شده اند.	
	خواب آور ها و آرام بخش ها	
	باربیتورات ها	
	فنوتیازین	
	ضد افسردگی ها	
	ملین ها و یا دیورتیک ها	
	نارکوتیک ها	
۲	فقط یکی از داروهای بالا را دریافت کند	
۱	هیچ یک از داروهای بالا را استفاده نکند یا اصلا دارو دریافت نکند.	
	فقط یکی از داروهای بالا را دریافت کند	بیماران در خطر پایین سقوط: امتیاز ۷ - ۱۱
	بیماران در خطر بالای سقوط : امتیاز ۱۲ و یا بیشتر	