



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

ارزیابی ریسک ترومبوآمبولی وریدی -
ولز Wells Criteria VTE

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
شماره سند :
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵ / ۰۲ / ۰۱
تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۵ / ۰۲ / ۱۵
تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۶ / ۰۲ / ۰۱
ویرایش : ۵

ارزیابی ریسک ترومبوآمبولی وریدی - ولز

ریسک فاکتور	امتیاز	نمره اکتسابی
جراحی و یا صدمه یا گچ در اندام تحتانی - پارزی یا پارالایزی	+۱	
بستری در تخت بیش از سه روز یا جراحی بزرگ در چهار هفته قبل	+۱	
تندرنس در مسیر ورید های پشت زانو یا رانی	+۱	
تورم یک عضو	+۱	
ادم گوده گذار در اندام مبتلا	+۱	
تورم بیشتر از سه cm یک پا نسبت به پای دیگر در ۱۰ سانتی متری زیر زانو	+۱	
تورم عروقی محیطی که ناشی از واریس نباشد	+۱	
داشتن سابقه DVT قبلی	+۱	
بدخیمی حاد یا درمان شده که شش ماه قبل بوده است	+۱	
تشخیص جایگزین با احتمال بیشتری نسبت به DVT	-۱	
نتایج ارزیابی :	احتمال کم	۱ - ۰
	احتمال متوسط	۲ - ۱
	احتمال بالا	۳ - ۸