



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

محاسبه مقیاس هوشیاری در بخش های ICU به روش Four

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

شماره سند : ویرایش : ۵

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۶/۰۲/۰۱

محاسبه مقیاس هوشیاری در بخش های ICU به روش Four

محاسبه مقیاس هوشیاری در بخش های ICU به روش Four														
باز کردن چشم	پلک ها باز است یا نسبت به دستور پلکها را باز می کند ، پلک می زند و شی را تعقیب می کند.	۴	نشان دادن اعداد با انگشتان دست یا مشت کردن آن طبق دستور	پاسخ حرکتی	واکنش مردمک و قرنیه وجود دارد	پاسخ ساقه مغز	۴	لوله داخل نای ندارد، الگوی تنفسی عادی است	تنفس					
										پلکها را باز می کند اما با چشم چیزی را تعقیب نمی کند.	۳	واکنش مردمک ها گشاد و ثابت است	۳	لوله داخل نای ندارد ، الگوی تنفس شین استوک است
										پلکها بسته است اما نسبت به صدای بلند آنها را باز می کند	۲	فقدان واکنش مربوط به مردمک یا قرنیه	۲	لوله داخل نای ندارد، تنفس نامنظم است
										پلک ها بسته است اما نسبت به محرک دردناک آنها را باز می کند	۱	فقدان هر دو واکنش مردمک و قرنیه	۱	تعداد تنفس بیمار از تعداد تنفس دستگاه ونتیلاتور بیشتر است
										پلک ها نسبت به محرک دردناک هم بسته می مانند	۰	فقدان واکنش مربوط به مردمک ، قرنیه و سرفه	۰	تعداد تنفس بیمار از تعداد تنفس دستگاه ونتیلاتور کمتر است
Total Score														