

## \*\*\*تداخلات دارویی مهم\*\*\*

۱. الکل ❗ استامینوفن

۲. دیگوکسین ❗ وراپامیل
۳. دیگوکسین ❗ آمبودارون
۴. پتابلو کرها ❗ انسولین
۵. تیازید ها (هیدروکلروتیازید) ❗ لیتیم
۶. ریفامپین ❗ داروهای ضد قارچ (کتوکونازول و ...)

۷. آنتی بیوتیک ها ❗ استروژن ها
۸. سالیسیلات ها (آسپرین) ❗
- کورتیکواستروئیدها
۹. وارفارین ❗ آمبودارون
۱۰. NSAIDs ❗ ضد انعقاد ها
۱۱. ونکومايسين ❗ سایر آنتی بیوتیک ها
۱۲. وارفارین ❗ فنی توفین
۱۳. پتاسیم کلراید ❗ اسپرونولاکتون

برخی از عوارض شایع تداخل داروهای که با هم مصرف کرده اید عبارتند از: حالت تهوع ، بهم ریختن معده، سردرد، سوزش معده و سرگیجه

عوارض جدی تر و گاه خطرناک تداخل دارویی عبارتند از: افت شدید فشار خون، نامنظم یا تند شدن ضربان قلب و تجمع سموم که به قلب یا کبد آسیب می رساند

## تعریف تداخلات دارویی:

تداخل دارویی زمانی رخ می دهد که شرایطی شامل دارو، فرآورده ی گیاهی یا غذا علاوه بر داروی اول (داروی اصلی) تجویز شود و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد.

تداخلات دارویی یکی از موارد زیر را در سبب می شوند :

۱. سبپرس نمودن پاسخ درمانی
۲. کاهش اثرات درمانی
۳. وقوع اثرات سمی و کشنده

## !!!! انواع تداخلات دارویی مرگبار!!!!

۱. سرم رینگر ❗ خون و فرآورده های خونی
۲. سرم رینگر ❗ آمپول سفتریاکسون
۳. آمپول سولفات متیزوم ❗ کپسول آدالات
۴. سرم دکستروز ❗ آمپول اکسی توسین
۵. سرم دکستروز ❗ آمپول فنی توفین
۶. آمپول بی کرینات سدیم ❗ آمپول اپی نفرین
۷. آمپول بی کرینات سدیم ❗ آمپول دوبوتامین
۸. آمپول بی کرینات سدیم ❗ آمپول دوپامین

نکته: فاصله ی زمانی بین تزریق آمپول سفتریاکسون و سرم رینگر حداقل باید ۴۸ ساعت باشد، مابقی موارد نباید به صورت هم زمان فقط تزریق شوند.



## تداخلات دارویی مرگبار

DRUG  
INTERACTIONS



\*ایمنی دارویی\*

کارگروه ایمنی معاونت درمان  
دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهریور ۱۴۰۳

## مدیریت تداخلات دارویی:

جهت پیشگیری و ممانعت از ایجاد تداخلات دارویی، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. انجام منظم تلفیق دارویی توسط ناظر دارویی بیمارستان
2. اخذ تاریخچه ی دقیق داروهای مصرفی در منزل از بیمار
3. دبل چک نمودن داروهای مورد استفاده در بخش ها از جهت تشابه ظاهری و اسمی
4. آموزش علائم خطر بروز تداخل به بیمار



منابع:

1. کتاب اصول اولیه در مراقبت های دارویی در داروخانه
2. کتاب Drug Interaction Fact
3. سایت های معتبر دانشگاهی



## بر اساس Medscape

یکی از مهم ترین انواع طبقه بندی ها، طبقه بندی بر اساس شدت تداخلات دارویی است.

بر این اساس می توان تداخلات دارویی را به چهار سطح زیر طبقه بندی کرد.

1. موارد کنترااندیکه (contraindicated): داروهایی که نباید همزمان با هم مصرف شوند.
2. موارد شدید (major): که اثرات دارو تهدیدکننده ی حیات است و ادامه ی آن منجر به آسیب دائمی در بیمار میشود.
3. موارد متوسط (moderate): که اثرات دارو ممکن است منجر به بدتر شدن شرایط بالینی بیماران و نیاز به درمان اضافی و اقامت بیشتر در بیمارستان شود.
4. موارد خفیف (minor): به این صورت است که اثرات دارو معمولا خفیف است و نتایج ممکن است غیرقابل توجه باشند و نتیجه ی درمان را به طور ویژه تحت تأثیر قرار نمیدهند.

## طبقه بندی تداخلات دارویی:

### بر اساس UpToDate

تداخلات به ۵ گروه A, B, C, D و X تقسیم می شود:

- A, B و C اهمیت بالینی خاصی ندارند.

• D: Consider Therapy Modification  
به بیمار علائم بالینی بروز تداخل اعلام شود تا در صورت بروز دارو قطع شود و اقدام جایگزین در نظر گرفته شود.

مثال: تداخل فلوکونازول + آنتوراستاتین

- X: منع مصرف مطلق!!!! راهی برای استفاده هم زمان وجود ندارد.

مثال: تداخل کلپیدوگرنل + آمپرازول

