




دسته داروئی	فواصل ارزیابی مجدد
آنتی بیوتیکها (تزریقی)	۴ روز
آنتی بیوتیکها (خوراکی)	۱۰ روز
آنتی بیوتیکها (موضعی)	۱۰ روز



داروهای خودبه خود متوقف شونده

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می

شود که به علت اثرات و عوارض خاص ، پس از گذشت مدت

زمان معینی ، نباید مصرفشان ادامه یابد و جهت ادامه تجویز

باید از پزشک دستور مجدد گرفته شود .

هدف از تعریف این داروها ارزیابی دوره ای داروهای خاص و

اطلاع آن به پزشک و گرفتن دستور جدید برای ادامه مصرف

می باشد تا تیم درمان از تجویز ایمن داروی بیمار، اطمینان

حاصل نماید .

لیستی از این داروها توسط ناظر داروئی داروخانه تهیه و

تنظیم شده و در اختیار بخش های بیمارستان و نیز داروخانه

قرار می گیرد.

در سه موقعیت نیاز به بررسی این نوع داروها جهت ادامه

مصرف یا قطع آن می باشد شامل :


(۱) انتقال بیمار از ، یا، به بخش های ویژه


(۲) انتقال بیمار به یک بخش دیگر

(۳) ترخیص بیمار



داروهای خودبه خود متوقف شونده






فواصل ارزیابی مجدد	دسته داروئی
۷ روز	کورتیکواستروئیدها (بجز داروهای موضعی)
۷ روز	کورتیکواستروئیدها (چشمی و خوراکی)
۱۰ روز	NSAIDs
۵ روز	کتورولاک (خوراکی و تزریقی >۲سال)



فواصل ارزیابی مجدد	دسته داروئی
۷ روز	وارفارین
۱۰ روز	انوکسپارین و هپارین



فواصل ارزیابی مجدد	دسته داروئی
۳ روز	داروهای ضد اسهال
۱۴ روز	داروهای ضد یبوست



تهیه و تنظیم: کارگروه ایمنی بیمار
منبع: دستورالعمل های مرتبط و سایت های معتبر
شهریور ماه سال ۱۴۰۳